



Tel : 06 46 83 15 92
camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN
Vétérinaire Consultant
Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 15/02/2017
Vétérinaire traitant: Dr. Clause

Propriétaire : Mme Christian
Animal : Mya, Dogue de Bordeaux, F,
née le 17/10/2008

ANAMNESE

- Hématurie améliorée sous amoxicilline acide clavulanique
- Paroi hypertrophiée avec suspicion de masses et/ou polypes vésicaux

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi épaissie de façon modérément irrégulière (5 à 8 mm). Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 7 cm RD : 7,8 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 7,2 mm SD : 7,1 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Discrète différence d'échogénicité entre les lobes, contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.

- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/
Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Ovaires G et D : RAS
Col et cornes utérines : RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/
biopsies :** Cytoponctions échoguidées de la paroi vésicale (2 lames)

CONCLUSION

- ❖ **Epaississement pariétal vésical diffus et irrégulier compatible avec une cystite en première intention. Cependant une infiltration tumorale diffuse de type carcinome transitionnel ne peut être totalement exclue. Deux cytoponctions échoguidées à l'aiguille fine ont été réalisées.**
- ❖ **Hépatopathie non spécifique, à relier à la clinique.**

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site : veterinairesconsultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
06 16 66 66 54
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
06 46 83 15 92
camilleodin@gmail.com