



Tel : 06 46 83 15 92  
camilleodin@gmail.com

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Camille ODIN**  
Vétérinaire Consultant  
Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 15/02/17  
Vétérinaire traitant: Dr. Chantraine

Propriétaire : Mme Menguy  
Animal : Altesse, Cocker Américain,  
FS, née le 17/06/2005

## ANAMNESE

---

- Cystite suite PU/PD
- Biochimie : PAL 1135 U/L et hypercholestérolémie

## EXAMEN

---

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Cortex épaissi et discrètement hétérogène. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 5,7 cm RD : 6,2 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 4,9 mm SD : 5,4 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Masse située dans le lobe latéral gauche de taille modérée (2,5 cm) de forme arrondie, aux contours bosselés, hétérogène, hyperéchogène. Parenchyme hépatique hétérogène avec plages hypéchogènes mal délimitées et 2 nodules hyperéchogènes (9 mm).
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.

- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/  
Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisée.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/  
biopsies :** Non souhaitées

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Masse hépatique (2,5 cm) située dans le lobe latéral gauche avec présence de lésions diffuses sur le reste du parenchyme hépatique. Avec cet aspect une tumeur bénigne ou maligne peut être envisagée. Le diagnostic de certitude repose sur la réalisation de prélèvements.**
- ❖ **Signes discrets de néphropathie bilatérale chronique.**

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille  
Vétérinaire (n° 24738)  
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à [camilleodin@gmail.com](mailto:camilleodin@gmail.com)

---

**Site : [veterinairesconsultants.fr](http://veterinairesconsultants.fr)**

**Dr M.Hélène LASSERON**  
Echographie abdominale  
Echographie cardiaque  
Médecine interne et cardiologie  
**06 16 66 66 54**  
[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

**Dr Camille ODIN**  
Echographie abdominale  
Echographie cardiaque  
**06 46 83 15 92**  
[camilleodin@gmail.com](mailto:camilleodin@gmail.com)