



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**  
Vétérinaire Consultante  
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT  
Diplômée du CEAV de Médecine Interne  
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.  
N°Ordinal: 18551

Date : 08/08/2017  
Dr.Vétérinaire : TURBE

**Propriétaire :** BOTFIELD  
**Animal :** "BELLE", européenne FS née le  
01/04/04

## ANAMNESE

---

- **Anorexie, abattement, perte de poids rapide**

## EXAMEN

---

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.  
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.  
Architecture en couches conservée.  
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Epaissement pariétal (11 – 13 mm) circonférentiel hypoéchogène avec perte des couches au niveau du jéjunum, sur 7 cm de longueur. A certains endroits en périphérie les contours sont mal délimités avec hyperéchogénicité du mésentère et de l'épiploon adjacents (ulcérations et adhérences).
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité diminuée.
- **Nœuds lymphatiques :** Mésentériques : 12,6 X 34 mm, coliques moyens 10 mm diamètre.  
Hypoéchogènes avec halo hyperéchogène net en périphérie.
- **Mésentère/ Cavitité abdominale :** Hyperéchogénicité en périphérie de la lésion digestive et des nœuds lymphatiques digestifs hypertrophiés.
- **Appareil** castrée

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

reproducteur :

- Autre RAS
- Cytoponctions/  
biopsies : Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Tumeur maligne de l'intestin grêle (7 cm) ulcérée avec péritonite adjacente et métastases aux nœuds lymphatiques (coliques, mésentériques). Un lymphome ou un carcinome est possible avec cet aspect.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON