

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT Diplômée du CEAV de Médecine Interne Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive. N°Ordinal: 18551

Propriétaire : LETERRIER

Animal: "CARTMAN", dogue argentin MC

10 ans.

<u>Date</u>: 06/02/17 <u>Dr.Vétérinaire</u>: CHERIX

ANAMNESE

- □ AVP (tracteur) il y a 10 jours.
- □ Fracture du bassin.
- □ Incontinence urinaire et parésie postérieure non ambulatoire depuis.
- □ Abattement, amaigrissement, vomissements.
- Sondages vésicaux réguliers
- □ Sous corticoïdes pendant 10 jours
- □ Animal déshydraté lors de l'examen.

EXAMEN

Vessie: Très remplie. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène avec nombreuses particules échogènes en suspension.

Absence de dépôt sédimenteux ou de lithiase vésicale.

Reins: Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire

bien visible. Dilatation pyélique bilatérale discrète (G 3,6 mm, D 2 mm).

RG 8,9 cm, RD 8,2 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
 Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.

Rate : Taille, contours et échogénicité normales.

> **Foie:** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.

Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .

> **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.

Architecture en couches conservée. Paroi 4,9 mm.

Absence d'anomalie pylorique.

Pancréas : Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale en périphérie.

Duodénum : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

Jéjunum/iléon: Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,5

mm.

Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.

Nœuds normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à <u>mhlasseron@yahoo.fr</u>.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 65 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

lymphatiques:

Mésentère/ Hyperéchogénicité modérée de la graisse abdominale en zone très caudale à

Cavité abdominale : hauteur de la filière pelvienne craniale.

> Appareil

Castré, prostate involuée.

reproducteur:

Autre RAS

Cytoponctions/ biopsies: Non réalisées.

CONCLUSION

❖ Vessie très remplie et urines de stase avec sédiment en suspension.

- ❖ Pyéléctasie discrète bilatérale éventuellement compatible avec une pyélonéphrite : à confronter au bilan sanguin rénal et à une analyse d'urine éventuelle.
- ❖ Inflammation abdominale diffuse ante-pelvienne, modérée (à mettre en relation avec l'AVP et le traumatisme du bassin)
- Estomac vide, sans anomalie pariétale ou corps étranger décelable.
- * Reste du tube digestif normal.
- * Absence d'autre anomalie abdominale décelable ce jour.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON 8, reute de Courseutée 14610 COLOMBY-SUR-THAON N° 18551