

# **ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

#### Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT Diplômée du CEAV de Médecine Interne Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive. N°Ordinal: 18551

<u>Date</u>: 24/02/17 <u>**Propriétaire**</u>: MOIZO

<u>Dr.Vétérinaire</u>: RAUX <u>Animal</u>: "CRUMPETTE", border FS née en

juin 2007

## **ANAMNESE**

Augmentation progressive des PAL (539) et ALT (100)

□ Selles galireuses depuis longtemps

## **EXAMEN**

Vessie : En semi repletion. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.

Reins: Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire

bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.

RG 5,2 cm, RD 5 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.

G: 4,9 mm, D:5 mm d'épaisseur maximale

Rate : Taille, contours et échogénicité normales.

Foie: Lobe latéral gauche déformé par une masse ronde isoéchogène tissulaire

faiblement hétérogène de 6 X6,5 cm de diamètre. Contours nets bien délimités. Proximité avec la veine sus hépatique gauche repoussée et accolée médialement à

la masse

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .

> **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.

Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.

Pancréas : Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale en périphérie.

Duodénum : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 4 mm.

Jéjunum/iléon : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3

mm.

Colon : Paroi épaissie de facon discrète et régulière dans une zone caudale du colon

descendant (2,5 mm) avec couches conservées.

Selles normales.

Nœuds normaux

lymphatiques:

Mésentère/ RAS

Cavité abdominale :

Images échographiques disponibles sur demande email à <u>mhlasseron@yahoo.fr</u>.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Appareil castrée reproducteur :

Autre

RAS

Cytoponctions/

Non réalisées.

biopsies:

## **CONCLUSION**

- Masse hépatique de 6 cm de diamètre localisée et très bien délimitée dans le lobe latéral gauche, d'aspect bénin en première intention (adénome, hyperplasie...). Une origine tumorale maligne ne peut être totalement exclue mais semble nettement moins probable en relation avec l'imagerie, l'évolution et la clinique.
- \* Absence de métastases abdominales décelables.
- Discrète colite distale non spécifique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON 8, reute de Courseulles 14618 COLONBY-SUR-THAON N° 18551