



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**  
Vétérinaire Consultante  
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT  
Diplômée du CEAV de Médecine Interne  
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.  
N°Ordinal: 18551

Date : 31/03/17  
Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

Propriétaire : GRONDIN  
Animal : "CHOUQUETTE", européenne, FS  
née le 21/04/03

## ANAMNESE

---

- Amaigrissement progressif depuis quelques mois**
- Baisse de forme**
- Anémie**
- Masse abdominale 2-3 cm palpable**

## EXAMEN

---

- **Vessie :** Vide. Paroi régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Bosselés, cortex hyperéchogène, atténuation corticomédullaire. Taille diminuée.  
Liseré médullaire hyperéchogène.  
RG 3,7 cm, RD 3,2 cm. Dilatation pyélique 2 mm à droite.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.  
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.  
Architecture en couches conservée. Paroi 2 mm.  
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Plusieurs portions (au moins 2 dans le jéjunum et 1 dans l'iléon) présentent une paroi anormale : épaissie hypoéchogène avec perte des couches, de façon plus ou moins circonscrite. Portions atteintes sur 2-3 cm, paroi épaissie entre 5 à 11 mm.  
Contenu stagnants muqueux à liquide. Hypomotilité.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité diminuée.

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Nœuds lymphatiques :** Mésentériques hypertrophiés 8 mm épaisseur
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** RAS
- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Tumeur digestive intestinale multicentrique avec ulcération et épaississement de la paroi sur au moins 3 endroits (jéjunum et iléon).**
- ❖ **Lymphadénomégalie mésentérique associée.**
- ❖ **Iléus généralisé secondaire.**
- ❖ **Néphropathie bilatérale chronique d'intensité assez marquée.**

Un lymphosarcome digestif semble très probable avec cet aspect.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON