



mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 29/03/17
Dr.Vétérinaire : CHAPUIS

Propriétaire : HIRARD
Animal : "BAHIA", X Scottish F 11A

ANAMNESE

- ☐ **Pertes vulvaires**
- ☐ **Masse minéralisée radiographiquement visible proche rein droit**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 6,2 cm, RD 6,44 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Gauche diminuée,
droite nettement augmentée, contour réguliers hyperéchogènes, ronde avec cône d'ombre franc (minéralisée)
SD 3,2 cm diamètre.
SG 4 mm épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité diminuée de façon diffuse, et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'air. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi 3 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Vide, peu de selles, paroi légèrement épaissie
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** Epanchement hypoéchogène cellulaire modéré, et hyperéchogénicité diffuse de la

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Cavité abdominale : graisse abdominale.

- **Appareil reproducteur :** Ovaires : normaux. Follicule 5 mm à G. Cornes : dilatées par du liquide cellulaire hypoéchogène sur 12,5-2 cm de diamètre, paroi affinée.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Pyomètre avec paroi utérine affinée : risque de rupture.**
- ❖ **Stéatite abdominale diffuse et épanchement abdominal cellulaire compatible avec une péritonite associée.**
- ❖ **Adrénomégalie minéralisée à droite, sans envahissement périphérique suspect, avec surrénale droite de taille diminuée : un Cushing d'origine surrénalienne droite est possible avec cet aspect. A confronter à la clinique et aux éventuels tests sanguins.**
- ❖ **Hépatite réactionnelle.**
- ❖ **Colite.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON