



mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 20/03/17
Dr.Vétérinaire : BERGER

Propriétaire : TREGAUT
Animal : "ASIA", whippet, F née en 2005

ANAMNESE

- ☐ **Anémie normochrome normocytaire, thrombopénie, abattement et dysorexie depuis 10 jours.**
- ☐ **Un épisode de chute dans les escaliers**
- ☐ **Cause hémolytique peu probable.**

EXAMEN

- **Vessie :** Peu remplie. Paroi régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
Pole rénal caudal hilaire droit déformé par une volumineuse cavité anéchogène de paroi fine sur 4,4 X 3,9 cm. Absence de sédiment dans la cavité. Parenchyme rénal normal en périphérie avec architecture et échogénicité conservées. Absence d'obstruction du flux urinaire associé.
RG 5,3 cm, RD 5,8 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 4,7 mm, D : 4,9 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale en région fundique.
Epaississement localisé de la musculature avec couches conservées en zone de l'antre pylorique (partie craniale) ou l'épaisseur de la paroi atteint 9,5 mm.
Absence d'obstruction pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,5 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** Présence de peu de liquide anéchogène dans les deux cornes utérines dilatées à 5-6 mm environ. Paroi normale.
Follicule de 3,4 mm au niveau de l'ovaire gauche.
Absence de kystes. Ovaires normaux. Col utérin normal.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Kyste rénal bénin à droite de découverte fortuite (4,9 X 3,2 cm)**
- ❖ **Discret épaissement de la paroi de l'antrum pylorique compatible avec une zone de gastrite non spécifique, d'intensité peu marquée.**
- ❖ **Discret hydromètre bénin.**

Absence de saignement abdominal, ou d'anomalie abdominale pouvant expliquer l'anémie.
A envisager : ponction de moëlle osseuse, dépistage rickettsioses, recherche hypothyroïdie, ...

NB : absence d'épanchement pleural ou de lésion cardiaque majeure au simple examen thoracique (vue 2D longitudinale 4-5 cavité abord gauche).

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON