



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant

Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 20/04/2017
Vétérinaire traitant: Dr. Barré

Propriétaire : Mme Halley
Animal : Max, x Boxer, M, né le 25/10/2003

ANAMNESE

- ☐ PU/PD
- ☐ Bilan biochimique 12 P dans les normes hormis hypercholestérolémie
- ☐ SSAG

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. Minéralisations bilatérales des récessus du bassin. RG : 6,4 cm RD : 6,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 6,2 mm SD : 6,1 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille légèrement augmentée. Echogénicité normal, contours légèrement arrondis. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu hyperéchogène sous forme de petites interfaces (4-6 mm) générant un cône d'ombre.
- **Estomac :** Présence d'aliments et d'air en quantité importante. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.

- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/
Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Prostate RAS
Testicules RAS
- **Autre** RAS
- **Cytaponctions/
biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Légère hépatomégalie pouvant être secondaire à une surcharge glycolipidique en première intention. A relier à la clinique.**
- ❖ **Lithiases biliaires en quantité modérée sans obstruction des voies biliaires.**
- ❖ **Signes discrets de néphropathie bilatérale chronique débutante.**

Confraternellement,

Dr Camille Odin


Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site : www.veterinaires-consultants.fr

Dr M. Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com