



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**  
Vétérinaire Consultante  
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT  
Diplômée du CEAV de Médecine Interne  
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.  
N°Ordinal: 18551

Date : 12/04/17  
Dr.Vétérinaire : BARRE

**Propriétaire :** MARCHAL  
**Animal :** "LEO", européen MC né le  
01/12/07.

## ANAMNESE

- Vomissements chroniques**
- Réponse partielle puis échappement à la cortisone**

## EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Liseré médullaire hyperéchogène bilatéral. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 3,9 cm, RD 4 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Peu d'aliments et de liquides présents. Au niveau du corps et de la petite courbure : paroi épaissie nettement (5-10 mm) de façon tissulaire hypoéchogène régulière homogène avec perte complète des couches et ulcérations superficielles. Reste de l'estomac normal. Pylore normal.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,4 mm. Pas de contenu alimentaire.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité diminuée.
- **Nœuds lymphatiques :** Pancréatico-duodéal légèrement hypertrophié 6 mm.
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :** RAS
- **Appareil** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

**reproducteur :**

- **Autre** castré
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

**CONCLUSION**

---

- ❖ **Tumeur de l'estomac proximal, proche de la petite courbure, très fortement compatible avec un lymphome de l'estomac. Paroi ulcérée superficiellement, épaissie sur environ 5-10 mm d'épaisseur sur une zone de 3-4 cm de diamètre.**
- ❖ **Lymphadénomégalie pancréatico-duodénale modérée associée (6 mm) sans autre anomalie abdominale décelable.**

*75% des lymphomes de l'estomac chez le chat sont des formes à petite cellules. Un traitement associant prednisolone et Chlorambucil est possible (20 mg/m<sup>2</sup> toutes les 2 semaines PO avec suivi NFS tous les 15 jours entre chaque prise pour dépister GB<1500 ou PLT <75000 justifiant le report de la prise). La rémission est possible en 1-2 mois. L'espérance de vie peut aller jusqu'à 18-24 mois. Oméprazole et pansements gastriques en traitement symptomatiques.*

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON