



mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 10/04/17
Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

Propriétaire : LECONTE
Animal : "PEPETTE", pinsher FS née en 2003

ANAMNESE

- **Abattement douleur abdominale, anorexie et perte de poids**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 4,2 cm, RD 4,3 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 4,4 mm, D : 5 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'un peu de liquide et de mucus stagnants. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Image hyperéchogène irrégulière sur 1,6 X 1,2 cm bloquée dans la lumière du jéjunum en position abdominale craniale. Paroi très amincie en regard et ulcérée.
Anses digestives jéjunales froncées avec paroi épaissie (3-4 mm) et couches conservées en amont.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité diminuée.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** Hyperéchogénicité du mésentère, et de la graisse abdominale en périphérie du corps étranger digestif.

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** stérilisée
- **Autre** Kyste liquidien isolé libre en région caudale abdominale droite superficiel de 8 mm.
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Obstruction digestive jéjunale par un corps étranger de 1,6 X 1,2 cm.**
- ❖ **Entérite et ulcérations digestives associées.**
- ❖ **Stéatite diffuse secondaire.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON