



mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 12/04/17
Dr.Vétérinaire : GUIADER

Propriétaire : COSSE
Animal : "JAROD", BA M né en 2014

ANAMNESE

- ❑ **Diarrhée chronique, amaigrissement**
- ❑ **Folates augmentés, B12 diminuées, TLI normales**
- ❑ **Un antécédent d'hypoalbuminémie à 21 g/L**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 7,6 cm, RD 7,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 3,4 mm, D : 3,3 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme très remplie. Paroi épaissie de façon généralisée (2,9 mm) et contenu hypoéchogène à échogène, mobile, réparti en zone déclive sur le 1/3 à la moitié du volume.
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi 4 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,7 mm.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi épaissie de façon modérée et généralisée avec couches conservées.
Certaines portions montrent une fine ligne échogène en profondeur de la muqueuse (fibrose mucosale). Du contenu digestif liquide et muqueux est présent, stagnant, avec dilatation modérée de plusieurs anses et hypomotilité.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité augmentée.
Colon dilaté.
- **Nœuds** Normaux (mésentériques 5 mm épaisseur)

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** Prostate 3,7 cm largeur, discrètement hétérogène.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Entérite chronique non spécifique et signes de maldigestion.**
Une origine allergique, alimentaire, dysimmunitaire est possible (MICI, ...). Des biopsies jéjunales sont indiquées pour préciser la nature de l'inflammation.
- ❖ **Cholécystite.**
Une infection biliaire ascendante à partir de la pullulation bactérienne chronique intestinale est à suspecter.
- ❖ **Colon dilaté par de l'air et des selles de consistance normale ce jour.**
- ❖ **Absence d'autre anomalie abdominale échographiquement décelable.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON