



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**  
Vétérinaire Consultante  
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT  
Diplômée du CEAV de Médecine Interne  
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.  
N°Ordinal: 18551

Date : 05/04/17  
Dr.Vétérinaire : CLAUSSE

**Propriétaire :** GAVEAU  
**Animal :** "FELINE", européenne FS née le  
15/07/07. 3,5 kgs

## ANAMNESE

- **Diarrhée aigue, PAL et ALT légèrement augmentées,**
- **Cure de Felimazole ND récemment suite à un dosage T4 supérieur à la normale**

## EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 3,8 cm, RD 3,8 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 5,6 mm, D : 5,5 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.  
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.  
Architecture en couches conservée. Paroi 2,1 mm.  
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,1 mm.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur légèrement augmentée à 2,6 mm. Contenu digestif liquide stagnant et dilatation modérée généralisée du jéjunum avec hypomotilité généralisée.
- **Colon :** Paroi épaissie à 1,6 mm avec couches conservées. Présence de selles très liquides.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Entéro-colite non spécifique, d'intensité marquée, avec iléus paralytique généralisé.**
- ❖ **Importante diarrhée dans le colon.**
- ❖ **Absence de signes en faveur d'un processus tumoral.**
- ❖ **Foie d'aspect normal ce jour.**

*Une origine infectieuse ou parasitaire est possible avec cet aspect (coronavirus, salmonelle, campylobacter, clostridies, E. coli, giardia, coccidies...).*

*Une origine dysimmunitaire /allergique ou une intoxication alimentaire sont également possible.*

*La diarrhée est un symptôme décrit dans l'hyperthyroïdie ainsi que l'augmentation des ALT.*

### Prise en charge conseillée :

Hospitalisation, perfusion, metronidazole 12-15 mg/kg M et S IV ou PO, traitement symptomatique de la diarrhée. Aliment riche en fibre hyperdigestible. Vermifuges. Suivi des T4.

En l'absence d'amélioration satisfaisante, une endoscopie digestive voie basse +/- haute est indiquée.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON