



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**  
Vétérinaire Consultante  
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT  
Diplômée du CEAV de Médecine Interne  
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.  
N°Ordinal: 18551

Date : 05/04/17  
Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

**Propriétaire :** LASSAY  
**Animal :** "MAYA", européenne FS née le  
01/01/06

## ANAMNESE

- Episode d'IRA en aout 2016 (Crea 130)**
- Vomit depuis 3 semaines, dysorexique.**
- Perte de poids, abattement**
- Bilan sanguin avec crea 24 et Urée 0,5 g/l**

## EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille légèrement diminuée, échogénicité et échostructure normales.  
Différenciation cortico-médullaire atténuée. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 3,7 cm, RD 3,6 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité augmentée de façon diffuse. Contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.  
Architecture en couches conservée. Paroi 2 mm.  
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur légèrement augmentée avec musculature légèrement plus épaisse que la normale par endroits.  
Paroi : 2,4-2,6 mm. Contenu muqueux à liquide stagnant en faible quantité.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Cf. autre
- **Mésentère/** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

**Cavité abdominale :**

- **Appareil reproducteur :** stérilisée
- **Autre** Présence d'une volumineuse lésion (7 X 2,5 cm) en zone rétro-péritonéale et inguinale, longeant l'aorte caudale et l'artère iliaque interne droite : aspect tissulaire plurilobé hypoéchogène avec réaction hyperéchogène périphérique et petit épanchement périphérique. La lésion encercle l'artère iliaque (retrait chirurgical complet impossible sans lésion vasculaire majeure)
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

**CONCLUSION**

---

- ❖ **Volumineuse lésion lombo-aortique de 7 x 2,5 cm, compatible avec une origine tumorale primitive (tumeur mésoenchymateuse, sarcome des tissus mous, ...) ou des nœuds lymphatiques lombo-aortiques très probablement tumoralisés. Des prélèvements peuvent permettre d'en préciser la nature si souhaité. Une chirurgie d'exérèse complète semble délicate étant donné l'extension et la localisation.**
- ❖ **Entérite chronique non spécifique d'intensité modérée.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON