



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant

Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 23/05/2017
Vétérinaire traitant: Dr. Chateiller

Propriétaire : Mme Zinoune
Animal : Gad, européen, MC, né le 31/08/2011

ANAMNESE

- ☐ Amaigrissement chronique
- ☐ Créatininémie 73 mg/l

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Contours légèrement bosselés.
RG : lithiase pyélique 6 mm sans dilatation pyélique – 3,4 cm
RG : Dilatation pyélique marquée avec présence de lithiases pyéliques de petite taille (3 mm) – 3,5 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible. Absence de visualisation de lithiase urétérale ni de dilatation notamment à droite.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales.
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine (< 2mm) et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/
Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisé.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/
biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Maladie lithiasique rénale chronique avec présence d'une lithiase pyélique de taille moyenne à gauche et dilatation pyélique marquée à droite avec quelques lithiases pyéliques de petite taille sans signe d'obstruction urétérale. Une pyélonéphrite intercurrente ne peut être totalement exclue.**

Des lithiases d'oxalate de calcium sont compatibles avec cet aspect et ne peuvent être dissoutes médicalement. Il existe un risque moyen à important d'obstruction urétérale pouvant induire une insuffisance rénale aigue.

Confraternellement,

Dr Camille Odin


Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site : www.veterinaires-consultants.fr

Dr M. Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com