

# **ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

#### **Dr Camille ODIN**

Vétérinaire Consultant Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

camilleouin@gmail.com

<u>Vétérinaire traitant:</u> Dr. Turbe <u>Animal:</u> Moka, Berger Australien, MC,

né le 08/02/2016

### **ANAMNESE**

Diarrhée depuis 10 jours. Aspect des selles : molles puis liquides.

Anorexie pendant cette phase de diarrhée

## **EXAMEN**

> **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.

**Reins:** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation

corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de

lithiase pyélique. RG: 5,8 cm RD: 5,9 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales: Taille, forme et échostructure normales. SG: 4,4 mm SD: 5,1 mm

Rate : Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours

normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours

normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.

Estomac: Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention

gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie

pylorique.

**Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Hyperéchogénicité de la graisse abdominale

environnante.

Duodénum : Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.

> **Jéjunum/iléon :** Paroi discrètement épaissie 4 mm. Architecture en couches conservée.

Aspect rectiligne des portions intestinales. Présence d'un iléus localisé au niveau de l'ileon avec présence d'interface 0,5 à 1 cm hyperéchogène générant des cones d'ombres ou des artefacts de réverbération. Absences

d'obstruction ou d'occlusion en amont ainsi qu'en aval de l'iléus.

Colon : Paroi fine. Présence d'un cone d'ombre important sur toute la portion de

colon descendant.

Nœuds

**lymphatiques:** lymphadénomégalie mésentérique : aspect homogène et échogène 3x1,3

cm et 3x1,2 cm

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur: Stérilisé.

Autre RAS

Cytoponctions/ biopsies: Non réalisées.

## **CONCLUSION**

Suspicion de CE colique non obstructif.

- Epaississement pariétal intestinal diffus évoquant une inflammation intestinale chronique sous jacente (MICI). Morceaux de corps étrangers de faible taille (1cm maximum environ) générant un iléus localisé au niveau de l'iléon, non obstructif. Lymphadénomégalie mésentérique marquée.
- \* Signes discrets de pancréatite associée.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille` Vétérinaire (n° 24738) camilléodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à <a href="mailto:camilleodin@qmail.com">camilleodin@qmail.com</a>

Site: www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie

mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN

Echographie abdominale Echographie cardiaque

camilleodin@gmail.com