



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 22/05/2017  
Dr.Vétérinaire : CHATEILLIER

**Propriétaire :** DESREAC  
**Animal :** "HELIUM", Beagle M né le  
03/01/12

## ANAMNESE

- Exérèse d'un polype pediculé recto-colique. Analyse de type carcinome infiltrant, avec marges infiltrées.**
- Bilan d'extension ce jour**
- TBEG**

## EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 6,8 cm, RD 7,6 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.  
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.  
Architecture en couches conservée. Paroi 3 mm.  
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.  
Présence de 2 images intraluminales tissulaires peu adhérentes à la paroi, possiblement pédiculées, en région du colon ascendant : aspect tissulaire homogène faiblement vascularisé, fixe, de 5-8 mm pour l'une, et ovalaire de 1,9 X 0,8 cm pour l'autre plus proximale.  
Paroi en regard non modifiée, couches conservées.  
Absence d'anomalie en région descendante.

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

**Nœuds lymphatiques :** Normaux. Iliques médiaux et coliques <4 mm  
➤ **Mésentère/** RAS  
**Cavité abdominale :**  
➤ **Appareil reproducteur :** RAS. Prostate 4,5 cm  
➤ **Autre** RAS  
➤ **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Suspicion de deux lésions polypoides coliques en partie ascendante (1,9 X 0,8 cm et 5-8 mm) sans modification de la paroi colique adjacente : des polypes pédiculés sont possibles avec cet aspect. D'autres examens sont nécessaires pour préciser la nature (coloscopie, coloscanner...)**
- ❖ **Absence de lésion du colon descendant décelable.**
- ❖ **Absence d'extension secondaire aux nœuds lymphatiques de drainage ou aux autres organes abdominaux.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON