



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 17/07/17
Dr.Vétérinaire : DELNOOZ

Propriétaire : DUPONT
Animal : "LEIA", x bichon caniche FS née en 2002

ANAMNESE

□ **Baisse de forme, amaigrissement**

EXAMEN

- **Vessie :** Peu remplie. Paroi régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille normale à gauche, diminuée à droite. Hyperéchogénéité corticomédullaire avec atténuation de la jonction. Dilatation pyélique gauche 1,4 mm, droite 3, 1 mm, sans obstacle urétéral. Absence de lithiase.
RG 3,6 cm. RD 2,8 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille augmentée à gauche et normale à droite. Forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 8,6 mm, D : 7,2 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme de taille légèrement augmentée. Au sein des lobes droits et du lobe carré, de nombreuses images fines hyperéchogènes avec cône d'ombre sont visible le long des vaisseaux portes, au sein des canalicules biliaires. Certaines sont volumineuses (1 cm à la base du lobe médial droit entre autre).
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec dépôt échogène mobile en zone déclive en quantité modérée .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur augmentée de façon régulière. Plis épaissis.
Architecture en couches conservée. Paroi 5 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds** normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil** stérilisée
- reproducteur :**
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/** Non réalisées.
- biopsies :**

CONCLUSION

- ❖ **Cholélithiases biliaires multiples, principalement réparties dans les canalicules biliaires des lobes droits. Cet aspect est le plus souvent associé à une cholangite chronique d'origine infectieuse et/ou dysimmunitaire.**
- ❖ **Gastrite non spécifique.**
- ❖ **Pyélectasie bilatérale et aspect compatible avec une pyélonéphrite bilatérale et une néphropathie chronique. Atrophie débutante du rein droit.**
- ❖ **Adrénomégalie gauche : une hyperplasie bénigne non sécrétante liée à l'âge ou à l'atteinte hépatique est possible. Une origine sécrétante (hyperplasie ou adénome, ou moins probablement adénocarcinome avec syndrome de Cushing) ne peut néanmoins être totalement exclue : à confronter à d'éventuels tests sanguins.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON