



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 15/05/17
Dr.Vétérinaire : RAUX

Propriétaire : JUIGNET
Animal : "BENJI", Yorkshire MC né le
15/10/06

ANAMNESE

- Uretrostomie sur strangurie et lithiases d'oxalates de calcium**
- Episodes de PICA**
- Episodes de douleurs abdominales et/ou dorsales**
- Hépatomégalie et ALT légèrement augmentées**
- Test stimulation ACTH avec Cortisolémie très légèrement augmentée**
- Pal Normales**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi régulière d'épaisseur normale. Contenu anéchogène avec dépôt sableux en zone déclive en petite quantité avec cône d'ombre associé, et multiples petites images (une vingtaines) mobiles hyperéchogènes avec discret cône d'ombre de 1-2 mm.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Multiples images hyperéchogènes avec cônes d'ombre le long des diverticules des deux bassins et au sein des cavités pyéliquies (2-4 mm) RG 4,6 cm, RD 4,4 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. G : 6,8 mm, D : 5,3 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille augmentée. Homogène. Hyperéchogénicité diffuse modérée. contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. Nodule hyperéchogène de 5,5 mm au sein du lobe latéral gauche.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Paroi 3,1 mm. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie. Kyste liquidien anéchogène isolé au niveau du corps (4,9 mm).
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. Hépatiques 2,5 et 3,2 mm épaisseur.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** RAS
- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre :** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Sablose et multiples petites lithiases vésicales de 1-2 mm sans signes de cystite ce jour.**
- ❖ **Lithiases pyéliquies rénales bilatérales non obstructives, multiples, à mettre en relation avec une maladie lithiasique chronique à oxalates de calcium.**
- ❖ **Hépatomégalie sans lymphadénomégalie suspecte ni adrénomégalie : une maladie de surcharge hépatique est possible avec cet aspect (surcharge glycoéolipidique, hépatopathie vacuolaire...). Une infiltration tumorale ou une hépatite chronique ne peuvent être totalement exclues : en cas d'augmentation des paramètres sanguins hépatiques, des biopsies après évaluation des temps de coagulation sont conseillées.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON