



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 26/06/17
Dr.Vétérinaire : LE GALL

Propriétaire : CHAPONNAIS
Animal : "PONETTE", européenne FS née le 01/11/07

ANAMNESE

- Vomissements et diarrhée épisodiques depuis plusieurs semaines.**
- A perdu 500g**
- Bilan sanguin NFS/Biochimie normal**
- Réponse ponctuelle aux AB/AIS/cerenia ND**

EXAMEN

- **Vessie :** Quasi vide. Paroi fine et régulière. 1,6 mm.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 3,6 cm, RD 3,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 4 mm, D : 4 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence de liquide digestif an faible quantité. Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale 1,6 .
Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
Hypomotilité.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie. Canal pancréatique principal normal 0,9 mm
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 1,5-2,3 mm. Présence de liquide anéchogène stagnant en quantité modérée et d'une hypomotilité intestinale généralisée modérée.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité diminuée et plus liquides que la normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil** stérilisée
- reproducteur :**

- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/** Non réalisées.
- biopsies :**

CONCLUSION

- ❖ **Signes indirects et modérés d'entérite et de colite non spécifique : une origine parasitaire, allergique, dysimmunitaire, infectieuse est possible avec cet aspect.**
- ❖ **Absence de signes en faveur d'une maladie inflammatoire chronique intestinale ou de lymphome digestif ce jour.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON