



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 30/06/2017
Dr.Vétérinaire : SERVAIS

Propriétaire : PIEL
Animal : "NAYA", européenne F née le 08/05/17

ANAMNESE

- ☐ **Distension abdominale**
- ☐ **Ponction de liquide jaune**
- ☐ **BEG**
- ☐ **PCR PIF ngatif sur le liquide**

EXAMEN

- **Vessie :** Poche liquidienne correspondant très probablement à la vessie : paroi fine, distension très importante repoussant les organes. Contenu anéchogène avec nombreuses particules anéchogènes en suspension.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 2,5 cm, RD 2,8 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Repoussés par la vessie dilatée. Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytopenctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ Distension vésicale majeure avec sédiment vésical, sans obstacle urétral décelable.
- ❖ Absence d'autre anomalie.

Une malformation du détrusor, de la jonction neuro-musculaire ou un défaut d'innervation du détrusor sont à envisager avec cet aspect.

Un traitement associant bétanechol, Xatral ND, antibiothérapie urinaire ponctuelles, et vidanges vésicales par taxis externe peut être proposé

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON