ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN
Vétérinaire Consultant
Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

camilleodin@gmail.com

Date : 10/07/2017
Vétérinaire traitant: Dr. Le Gall

Propriétaire : Mme Eudeline
Animal : Vicxy, européen, FS, née l 05/05/2005

ANAMNESE

- Vomissements chroniques avec appétit conservé
- Episode récent de diarrhée et anorexie amélioré sous cerenia, convenia, dexamedium, prifinial

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 3,9 cm RD : 4 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 3,4 mm SD : 3,1 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine (< 2mm) et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi très épaissie hypoéchogène de façon localisée sur une portion de la grande courbure jusqu'à 1,8 cm d'épaisseur avec disparition de l'architecture en couche à ce niveau. Présence de zone hyperéchogène (jusqu'à7 mm) à ce niveau. Absence de rétention gastrique ce jour.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

- **Colon :** Paroi épaissie sur 1 à 2 cm (5,8 mm) sur le colon descendant en regard avec la vessie avec conservation de l'architecture et l'échogénicité pariétale. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** NL gastrique : hétérogène épaissi : 0,85x1,2 cm
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisée.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- **Epaississement pariétal gastrique important (jusqu'à 1,8 cm) avec perte totale de l'architecture, localisé au niveau de la grande courbure avec présence de zones ulcératives gastriques et lymphadénomégalie gastrique modérée. Cet aspect est compatible avec une infiltration tumorale de l'estomac (lymphome en 1ere intention). Cependant un phénomène inflammatoire ne peut être totalement exclu bien que moins probable. Le diagnostic de certitude repose sur la réalisation de biopsie par voie endoscopique ou laparotomie.**
- **Epaississement pariétal colique modéré (5,8 mm) non obstructif localisé sur 1 à 2 cm sur le colon descendant en regard de la vessie. Un processus inflammatoire ou tumoral est suspecté.**

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site : www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com