



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 21/07/17
Dr.Vétérinaire : LE GALL

Propriétaire : BOULICAULT
Animal : "MARCUS", européen MC Né le
08/08/16

ANAMNESE

- ❑ **Douleur abdominale intense**
- ❑ **Anorexie et abattement depuis 4-5 jours**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 3,7 cm, RD 3,5 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence de peu de contenu liquide et digestif. Paroi d'épaisseur normale 2,5 mm.
Architecture en couches conservée.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Le corps présente une légère hypoéchogénicité et une hyperéchogénicité abdominale périphérique discrète est présente. Le reste des lobes présente une taille normale et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur 3,1 mm.
Aspect spastique festonné avec hyperperistaltisme. Peu de contenu liquide.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,5 mm. Certaines anses sont spastiques et festonnées avec hyperperistaltisme.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** Discrète hyperéchogénicité autour du corps du pancréas et en partie craniale

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- Cavité abdominale :** droite.
- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ Signes d'entérite spastique non spécifique (parasitaire, allergique, infectieuse)
- ❖ Pancréatite modérée en région du corps avec discrète stéatite associée.
- ❖ Absence d'autre anomalie abdominale décelable.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON