



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 19/07/17
Dr.Vétérinaire : DESCAMPS

Propriétaire : PENCREACH
Animal : "UGO", berger Shetland MC né en 2003

ANAMNESE

- ❑ **Abattement, dysorexie, améliorés sous corticoïdes**
- ❑ **Retrait de tumeur testiculaire avec signes de malignité (leydigome et sertolinome) en mai dernier**
- ❑ **Echographie abdominale de mai avec hyperplasie prostatique sans autre anomalie.**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire légèrement atténuée. Hyperéchogénicité diffuse bilatérale notamment comparativement à la rate. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 5,2 cm, RD 5,1 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Urètre prostatique béant sans obstacle (7,4 mm)
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. G :4,9 mm, D : 5 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Présence de très nombreux nodules hyperéchogènes bien délimités dans tous les lobes (de 4 à 18 mm de diamètre)
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec discret sédiment .
- **Estomac :** Absence d'aliments, présence d'air. Paroi d'épaisseur normale en zone fundique et du corps. Au niveau de l'antrum pylorique une lésion pariétale pédiculée est présente de 1,5 cm, avec couches muqueuse et sous muqueuse conservées. La lésion obstrue partiellement la lumière de l'antrum pylorique. Architecture en couches conservée. Pylore normal.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,3 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds** Normaux, notamment en iliaque médial et hépatique

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** Castré
Prostate involuée 2,5 cm largeur, légèrement hétérogène.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Cytoponctions échoguidées à l'aiguille fine de 5 nodules hépatiques sur animal tranquilisé

CONCLUSION

- ❖ **Apparition de nombreux nodules hépatiques (ponctionnés ce jour) depuis l'examen de mai, d'aspect compatible avec des métastases en première intention. Des nodules d'hyperplasie bénigne semblent moins probable mais ne peuvent être exclus dans l'attente des résultats de l'analyse cytologique.**
- ❖ **Signes de néphropathie chronique bilatérale d'intensité modérée.**
- ❖ **Polype dans l'antré pylorique de 1,5 cm, d'aspect bénin en première intention.**
- ❖ **Urètre béant en intra prostatique compatible avec une incompétence sphinctérienne : à corréler à la clinique.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON