

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Samme and Camarine

<u>Date</u>: 09/08/2017 <u>**Propriétaire**</u>: Mme Tavé

<u>Vétérinaire traitant:</u> Dr. Nenard <u>Animal:</u> Bô, européen, FS, 14 ans

ANAMNESE

 Amaigrissement chronique depuis 8 mois avec troubles digestifs intermittents : vomissements et constipation d'apparition récente.

- □ Biochimie standard dans les valeurs usuelles (U 0,49 g/L C 12,6 mg/L)
- Masse à l'entrée du thorax à droite de la trachée

EXAMEN

Vessie: Semi-remplie. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.

Reins: Echogénicité et taille normales. Cortex épaissi avec atténuation de la

différenciation. Kyste cortical gauche de taille moyenne (1 cm). Absence

de dilatation ou de lithiase pyélique. Minéralisations bilatérales des

diverticules du bassinet RG: 3,5 cm RD: 3,8 cm

Dretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.

• **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Taille, forme et échostructure normales. SG : 2,9 mm SD : 3 mm

Rate: Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours

normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours

normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.

Estomac : Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.

Absence de rétention gastrique ce jour.

Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.

Pancréas : Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale environnante.

Duodénum : Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.

Jéjunum/iléon: Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

> **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité très importante.

Nœuds

lymphatiques : Absence de lymphadénomégalie abdominale.

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur: Stérilisé.

> Autre RAS

Cytoponctions/ biopsies: Non réalisées.

CONCLUSION

- Lésions rénales marquées compatible avec une néphropathie bilatérale chronique.
- * Selles en quantité importante dans le colon descendant et transverse.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille` Vétérinaire (r' 24738) camilléodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site: www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie **Dr Camille ODIN**Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com