



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 30/08/17
Dr.Vétérinaire : MARTIN

Propriétaire : MARTEL
Animal : "BUDY", Yorkshire M né le 14/10/06

ANAMNESE

- ☐ **Diarrhée aiguë, distension abdominale d'apparition brutale**
- ☐ **Perte de contraste radiographique**
- ☐ **amyotrophie**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 4 cm, RD 4,1 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : mm, D : 5,4 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec sédiment mobile sur tout le contenu.
- **Estomac :** Peu d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi épaissie. Striation hyperéchogènes dans la muqueuses, très nombreuses et très visible. 5,9 mm
- **Jéjunum/iléon :** Paroi épaissie. Striation hyperéchogènes dans la muqueuses, très nombreuses et très visible. 5,9 mm
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence de selles très liquides.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** Epanchement paucicellulaire important.

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** Kystes prostatiques petits multiples. Testicules normaux.
- **Autre** RAS
- **Cytaponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Lymphangiectasie intestinale généralisée d'intensité marquée.**
- ❖ **Ascite secondaire, paucicellulaire (transsudant pur sur hypoalbuminémie très probable)**
- ❖ **Selles très liquides dans le colon**
- ❖ **Hyperplasie glandulokystique bénigne de la prostate, modérée.**
- ❖ **Absence d'autre anomalie abdominale**

Prise en charge conseillée :
Aliment hyperdigestible low fat STRICT au long cours
Suivis de l'albuminémie
Metronidazole 10 jours
Corticothérapie immunosuppressive en cas d'échec
Furosémide et spironolactone pour l'ascite
Traitement symptomatique de la diarrhée
Vermifugation si pas à jour.

Pronostic très réservé. 50% d'échec. Maladie chronique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON