

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT Diplômée du CEAV de Médecine Interne Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive. N°Ordinal: 18551

Propriétaire : EZANO

Animal: "TAMAYA", Yorkshire F née le

01/01/09

<u>Date</u>: 06/09/17 <u>Dr.Vétérinaire</u>: NENARD

ANAMNESE

- Troubles digestifs chroniques (PICA, vomissements, dysorexie) améliorés sous Zitac et avec muselière lors des promenades
- Sous Cardisur IECA et libeo 15 mg/j
- □ Bilan abdominal
- □ ABEG

EXAMEN

Vessie: En repletion. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.

Reins: Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire

bien visible. Dilatation pyélique bilatérale modérée de 2 mm. Multiples images

hyperéchogènes fines avec cone d'ombre le long des recessus pyéliqu

Es bilateraux.

RG 3 cm, RD 3,9 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.

G: 5,3 mm, D:4,6 mm d'épaisseur maximale

> **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.

Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.

> Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec sédiment échogène mobile sur

tout le volume.

Estomac : Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur augmentée ainsi que les plis en zone

pylorique, ces derniers emplissant la lumière. Architecture en couches conservée. Paroi 4-5 mm.

Absence d'anomalie au niveau du corps.

Pancréas : Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale en périphérie.

Duodénum : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

Jéjunum/iléon : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,9

mm.

Images échographiques disponibles sur demande email à <u>mhlasseron@yahoo.fr</u>.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.

Nœuds normaux

lymphatiques:

Mésentère/ RAS

Cavité abdominale :

> Appareil RAS

reproducteur:

> Autre RAS

Cytoponctions/ Non réalisées.

biopsies:

CONCLUSION

- Gastrite chronique hypertrophique pylorique d'intensité modérée.
- Lithiases rénales bilatérales bénignes.
- ❖ Absence d'autre anomalie décelable.

Prise en charge proposée : ZITAC ou MOPRAL, pansements gastriques, aliment hyperdigestible/hypoallergenique. En cas d'échec envisager la reprise d'une corticothérapie.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON 8, reute de Courseulies 14610 COLOMBY-SUR-THAON N° 18551