mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante en itinérant
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 14/11/16
Dr.Vétérinaire : RAUX

Propriétaire : GUESNAY
Animal : "HARRY", Scottish M

ANAMNESE

- ***Suivi de tumeur hépatique du lobe carré***
- ***Sous ursolvan ND, Zentonyl ND, Rodogyl ND et alimenttype hepatique***
- ***Echographie Novembre 2016 :*** Taille de la tumeur hépatique stationnaire. Zone de nécrose centrale et Kyste hépatique isolé de 2,7 X 2 cm en partie craniale, d'aspect bénin
- ***Dysorexie, perte de poids, PUPD***

EXAMEN

- **Vessie :** Peu remplie. Lésion pariétale cranio ventrale localisée tissulaiure de 2 X 0,85 cm avec foyer central hyperéchogène. Peu de vascularisation décelable. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Nombreux foyers corticaux hyperéchogènes piquetés. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
  RG 5,6 cm, RD 5,6 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
  G : 5,4 mm, D : 5 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Taille augmentée.
  Masse de 8 X 11 cm envahissant tout le lobe carré jusqu'à sa base proche du hile. Aspect tissulaire hétérogène plurilobé avec zone centrale hyperéchogène et petite zone cavitaire.
  Kyste liquidien de paroi fine en zone craniale droite contre le diaphragme proche de la vésicule de 2,7 X 2 cm.
  Lésion nodulaire hyperéchogène de 2,1 cm en partie craniale du lobe médial gauche.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu échogène mobile en quantité importante.
- **Estomac :** absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Repoussé dorsalement et caudalement par la masse hépatique.
  Architecture en couches conservée.
  Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Hépatiques 8 mm
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** RAS
- **Appareil reproducteur :** Testicules normaux, prostate légèrement hétérogènes rares petits kystes. 4,5 X 2,12 cm
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- Augmentation significative de la taille de la tumeur hépatique (11X8 cm ce jour).
- Découverte d'un nodule hépatique de 2 cm dans le lobe médial gauche, compatible avec une métastase.
- Masse pariétale ventrale de la paroi vésicale. Un carcinome vésical est à suspecter en première intention.
- Kyste hépatique isolé de 2,7 X 2 cm en partie craniale, d'aspect bénin.
- Foyers bilatéraux bénins de néphrocalcinose rénale.
- Légère lymphadénomégalie hépatique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.
Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON