

## **ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

## Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT Diplômée du CEAV de Médecine Interne Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive. N°Ordinal: 18551

**Propriétaire :** LAURANT

Animal: "LILY", européenne FS née le

01/06/08

<u>Date</u>: 20/09/17 Dr.Vétérinaire: BARRE<sup>2</sup>

**ANAMNESE** 

Cystite récidivante

□ Traitement associant antibiotiques, anti inflammatoires steroidiens et Zylkene ND

## **EXAMEN**

Vessie: Très peu remplie. Paroi nettement épaissie en zone craniale dorsale et ventrale,

de façon relativement régulière (4,9 mm).

Contenu anéchogène et présence d'un dépôt en quantité modérée,

hyperéchogène, avec cône d'ombre associé.

Col vésical libre.

Reins: Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire

bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.

RG 4 cm, RD 4 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
 Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

> **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.

> **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.

Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .

Estomac : Présence d'aliments (non à jeun) Paroi d'épaisseur normale.

Architecture en couches conservée. Paroi 2 mm.

Absence d'anomalie pylorique.

Pancréas : Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale en périphérie.

Duodénum : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

> **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2 mm.

Colon : Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.

Nœuds normaux

lymphatiques:

Mésentère/ RAS

Cavité abdominale :

Images échographiques disponibles sur demande email à <a href="mailto:mhlasseron@yahoo.fr">mhlasseron@yahoo.fr</a>.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Appareil stérilisée reproducteur :

> Autre

RAS

Cytoponctions/

Non réalisées.

biopsies:

## **CONCLUSION**

- \* Cystite d'intensité marquée, associée à une sablose vésicale modérée.
- \* Absence d'autre anomalie abdominale décelable ce jour.

Une cystite interstitielle chronique sous jacente est possible avec cet aspect. Le traitement conseillé au long cours associe alimentation préventive pour les lithiases urinaires de type humide, anti spasmodiques, anti inflammatoires, glycosaminoglycanes, anxiolytiques ...

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON 8, reute de Courseulies 14610 COLOMBY-SUR-THAON N° 18551