



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 06/09/17
Dr.Vétérinaire : TURBE

Propriétaire : LEROUX
Animal : "CHAMALLOW", birman MC né le 26/06/07

ANAMNESE

- Creat 30 il y a 1 an**
- Creat 33 ce jour, urée 0,7**
- Vomissements**
- Perte progressive de 1 kg ces derniers mois**
- PUPD depuis plus d'un an**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille diminuée modérément à droite et de façon discrète à gauche. Hyperéchogénicité corticomédullaire. Stries hyperéchogènes radiaires médullaires bilatérales. Contours normaux. Absence de lithiase. RG 3,7 cm. RD 3,3 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Paroi 1,6 mm. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Cavité abdominale :

- **Appareil reproducteur :** castré
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Néphropathie bilatérale chronique d'intensité modérée. Atrophie modérée débutante rénale gauche.**
- ❖ **Absence de lithiase urétrale, rénale ou vésicale.**
- ❖ **Absence d'autre anomalie abdominale décelable.**

Prise en charge conseillée :

Aliment pour insuffisant renal au long cours

IECA au choix ou telmisartan

Suivis sanguin réguliers (uree creat ca phosph) et pression artérielle si possible.

Mirtazapine de facon ponctuelle pour relancer l'appétit, 1 fois par jour, tous les 1 à 3 jours

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON