



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 06/09/17
Dr.Vétérinaire : BEDATON

Propriétaire : SABINE
Animal : "ULA", x Fox terrier FS née le 01/05/03

ANAMNESE

- Vomissements chroniques depuis 1-2 mois**
- Amaigrissement (associé au passage aux croquettes de régime)**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 4,7 cm, RD 4,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. G : 6 mm, D : 7 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille modérément augmentée. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. Discret nodule hyperéchogène en partie centrale gauche (8 mm) Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'aliments et d'air (polypnée). Paroi d'épaisseur normale en zone pylorique (2-3 mm). Présence d'un épaissement localisé de la paroi sur 1-2 cm de diamètre environ, situé en face craniale du corps de l'estomac. Aspect mal délimité, avec fine image linéaire hyperéchogène pénétrante à partir de la lumière sur la moitié de l'épaisseur. A ce niveau la paroi est évaluée à 1,1 cm d'épaisseur et les couches sont atténuées mais toujours visibles. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,8 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds** normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** stérilisée
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ Ulcération gastrique localisée au niveau d'un épaissement de la paroi en zone craniale du corps de l'estomac.
Une origine traumatique, inflammatoire ou tumorale est possible. Une endoscopie est conseillée en cas de persistance des symptômes après traitement (anti sécrétoires/antiacides, pansements gastriques...)
- ❖ Absence d'autre anomalie abdominale décelable.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON