

Date :

15/09/17

CHANTRAINE

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT Diplômée du CEAV de Médecine Interne Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive. N°Ordinal: 18551

Propriétaire : SAUTREUIL

Animal: "CAPUCINE", européenne FS

née en 2002

<u>Dr.Vétérinaire</u> : C

ANAMNESE

- □ Augmentation de l'albumine et du TP 89 g/L
- □ Augmentation modérée ALT et ASAT (135 et 235 UI/L)
- □ Dysorexie voire anorexie répondant ponctuellement à la cortisone
- □ Ne fait plus sa toilette, déambule voire pousse au mur, désorientation

EXAMEN

Vessie: En repletion. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène. Image tissulaire mobile de 1 cm en zone déclive, bien

délimitée homogène.

Reins: Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire

bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.

RG 3,9 cm, RD 4,2 cm

Absence d'anomalie échographiquement visible. **Urètre:** Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.

Rate : Taille, contours et échogénicité normales.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.

Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi très discrètement épaissie à 1 mm, et contenu anéchogène . Col,

canal cystique et conduit cholédoque normaux.

> **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.

Architecture en couches conservée. Paroi 2 mm.

Absence d'anomalie pylorique.

Pancréas : Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale en périphérie.

> **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2 mm

papille normale.

Jéjunum/iléon: Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,1

mm. Contenu alimentaire important.

Colon: Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.

Nœuds Hépatique 3,9 mm ovalaire centre hyperéchogène.

lymphatiques:

Mésentère/ RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à <u>mhlasseron@yahoo.fr</u>.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 65 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Cavité abdominale :

Appareil RAS

reproducteur:

RAS

> Cytoponctions/
biopsies:

Non réalisées.

Autre

CONCLUSION

* Très discrets signes de cholécystite sans autre anomalie abdominale décelable.

Sédiment vésical organisé, bénin (possible résidus inflammatoires de cystite), sans signe d'inflammation active ce jour.

Les lésions sont trop peu marquées pour expliquer la clinique. En relation avec l'anamnèse reste l'hypothèse d'une lésion cérébrale avec hypertension intracranienne.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON 8, reute de Courséultée 14610 COLOMBY-SUR-THAON Nº 18551