



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 09/10/17
Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

Propriétaire : TELLIER
Animal : "MICKEY", européen MC né en janvier 2016

ANAMNESE

- Vomissements ne rétrocedant pas aux traitements habituels depuis 3 jours.**
- A sorti un fil de couture dans se selles hier.**
- BEG sinon, examen clinique normal**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 3,6 cm, RD 3,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : mm, D : mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'un contenu digestif liquide en quantité faible. Paroi d'épaisseur normale. Absence de corps étranger décelable. Hypomotilité.
Architecture en couches conservée. Paroi 2,2 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Aspect festonné et spastique, sans corps étranger intraluminal visible (notamment pas de ligne hyperéchogène fixe). Epaisseur normale 2,5 mm.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 1,7 mm. Absence d'arrêt de transit.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Splénique isolé 3,2 mm
- **Mésentère/** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Cavité abdominale :

- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION


- ❖ **Duodénite non spécifique**
- ❖ **Discrète lymphadénomégalie splénique isolée (3,2 mm).**
- ❖ **Absence de péritonite ou de corps étranger digestif décelable ce jour.**

Une échographie de contrôle dans 48 h et un bilan sanguin sont conseillés en l'absence d'amélioration clinique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON