



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 06/10/17
Dr.Vétérinaire : GUIADER

Propriétaire : TURBET
Animal : "KEITARO", européenne FS 15A

ANAMNESE

❑ **Dysorexie, amaigrissement**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 3,5 cm, RD 3,6 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi épaissie légèrement de façon régulière (cf. épanchement abdominal) et contenu anéchogène. Canal cystique tortueux.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Contenu liquide en quantité modérée.
Hypomotilité.
Architecture en couches conservée. Paroi 2 mm.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** La portion transverse et descendante proximale est anormale : la paroi est épaissie de façon assez irrégulière sur 6 cm de longueur avec bords mal délimités. La paroi est évaluée à 5-6 mm d'épaisseur environ, avec perte des couches et aspect hypoechogène. Une sténose secondaire de la lumière est visible avec coprostase en amont.
Le mésocolon est hyperéchogène, et de petits nœuds lymphatiques ronds hypoechogènes y sont visibles (6-7 mm)
- **Nœuds lymphatiques :** Coliques hypertrophiés cf. supra.
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** Hyper chog n cit  de la graisse abdominale, centr e autour du colon transverse.
Epanchement an chog ne   hypo chog ne en quantit  mod r e.

- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Tumeur colique sur 6 cm avec extension au mésocolon et aux nœuds lymphatiques coliques.**
- ❖ **Epanchement abdominal et stéatite abdominale associés.**
- ❖ **Coprostase en amont.**
- ❖ **Hypomotilité gastrique probablement secondaire à l'inflammation abdominale diffuse.**

Un carcinome colique est possible avec cet aspect.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551