



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 13/11/17
Dr.Vétérinaire : BARRE

Propriétaire : DOUBLET
Animal : "NABUCCO", CT européen MC né
le 01/04/06

ANAMNESE

- ❑ **Amaigrissement, vomissements chroniques en augmentation depuis quelques semaines**
- ❑ **Bilan sanguin : légère hypoalbuminémie**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille normale. Différenciation cortico-médullaire atténuée avec présence de fines striations radiaires échogènes. Cortex épaissi. Hyperéchogénicité bilatérale.
Bassinets normaux.
RG 4,1 cm, RD 4,2 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Vide d'aliments. Paroi gastrique sévèrement épaissie de façon mal délimitée en zone fundique et du corps, avec perte des couches (9-15 mm épaisseur). Plis épaissis. Ulcérations superficielles. Graisse périphérique abdominale hyperéchogène modérément.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ Epaissement important et ulcératif de la paroi du corps de l'estomac sur une large zone. Aspect très fortement compatible avec une infiltration tumorale.
Un lymphome gastrique est à suspecter en première intention. Une endoscopie digestive avec biopsies peut permettre de préciser la nature de la lésion si souhaité.
- ❖ Glomérulopathie bilatérale chronique.
Une protéinurie associée est possible (cf. hypoalbuminémie).
- ❖ Absence d'autre anomalie abdominale décelable.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON