



[camilleodin@gmail.com](mailto:camilleodin@gmail.com)

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Camille ODIN**

Vétérinaire Consultant

Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 28/12/2017  
Vétérinaire traitant: Dr. Nenard

Propriétaire : Mme Leroy  
Animal : Elliot, Pinscher nain, MC, né le 9/06/2009

## ANAMNESE

---

- Historique de diarrhée chronique
- Sous alimentation HA avec épisodes de crises spasmodiques douloureuses et des selles molles
- Coprologie neg
- Biochimie dans les VU

## EXAMEN

---

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. Déplacée en position pelvienne.
- **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 4,2 cm RD : 3,8 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 4,7 mm SD : 4,5 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi épaissie 5,5 mm, couche muqueuse épaissie et hypoéchogène avec présence d'un discret piqueté hyperéchogène. Architecture en couches conservée.

- **Jéjunum/iléon :** Paroi épaissie 4,2 mm, couche muqueuse épaissie et hypoéchogène avec présence d'un discret piqueté hyperéchogène. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.
- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/  
Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisé.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/  
biopsies :** Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Epaississement pariétal duodénal, jéjunal et iléal modéré et diffus compatible avec une MICI (maladie inflammatoire chronique de l'intestin).**
- ❖ **Déplacement modérée de la vessie en région pelvienne.**

### Essais thérapeutiques possibles suite aux différents échecs et/ou récurrence avec les traitements précédents :

- Probiotic VSL #3 ND : ½ à 1 sachet par jour en continu ou en cure de 10j par mois (à commander sur internet).

Tylosine : 15 mg/kg/ 2x/j ou 25 mg/kg/j pendant une semaine. Parfois un traitement de 2 mois (15 mg/kg/j) est nécessaire si rechute à la fin du traitement d'une semaine.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille  
Vétérinaire (n° 24738)  
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à [camilleodin@gmail.com](mailto:camilleodin@gmail.com)

---

**Site : [www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)**

**Dr M.Hélène LASSERON**  
Echographie abdominale  
Echographie cardiaque  
Médecine interne et cardiologie  
[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

**Dr Camille ODIN**  
Echographie abdominale  
Echographie cardiaque  
[camilleodin@gmail.com](mailto:camilleodin@gmail.com)