



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant

Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 20/11/2019
Vétérinaire traitant: Dr. Chateiller

Propriétaire : Mme Durrieu
Animal : Espoir, Epagneul breton, M,
10 ans

ANAMNESE

- ❑ Amaigrissement chronique
- ❑ Creat > 136 mg/L – Urée > 2,7 g/L

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure conservée, corticale amincie, contours bosselés. Minéralisations du récessus du bassinet. Taille diminuée (de façon plus marquée à gauche) RG : 4,6 cm – RD 5,7 cm. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 5,2 mm SD : 5,5 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi irrégulière, épaissie de façon multifocale, hypoéchogène, jusqu'à 10 mm, sans perte de la structure en couche. Plusieurs zones punctiformes générant une queue de comète. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** NL mésentérique : hypoéchogène, taille très augmentée 4,3 x 2,3 cm, hétérogène. Stéatite périphérique.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Prostate : taille augmentée, multi-microkystes, hyperéchogène diffuse
Testicules : NO
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non souhaitées.

CONCLUSION

- ❖ **Néphropathie bilatérale de stade terminal avec atrophie rénale bilatérale, plus marquée à gauche.**
- ❖ **Gastrite urémique avec zones multifocales ulcérées.**
- ❖ **Adénopathie mésentérique très marquée avec stéatite périphérique. Des cytoponctions sont nécessaires pour préciser le diagnostic.**

Un traitement de soutien est conseillé :

- Oméprazole : 1 mg/kg, 2x/j
- Ulcar 1g : 1 sachet matin et soir, à distance des autres médicaments
- Emeprid, dose classique
- Ipakitine, dose classique

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com



Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site : www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com