



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant

Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 20/11/2019
Vétérinaire traitant: Dr. Chateiller

Propriétaire : M Ledard
Animal : Rapido, européen, FS, 11 ans

ANAMNESE

- Baisse de forme, amaigrissement
- Masse liquidienne observée à proximité du RD

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 3,8 cm RD : 3,65 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 3,4 mm SD : 3,8 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.
- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.

- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** L sion arrondie de taille moyenne 2,2x3,1 cm situ e en regard de la jonction il o-colique, de paroi fine, avec un contenu liquidien d'aspect cellulaire, avec des  l ments  chog nes mobiles en suspension.
- **Appareil reproducteur :** St rilis .
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Ponction  choguid e de la l sion : pr l vement de 2 mL de liquide blanc laiteux (type « lait-fraise ») et fibrineux. La l sion n'a pas  t  enti rement ponctionn e. 1  talement sur lame + 1 tube sec et 1 tube EDTA.

CONCLUSION

- ❖ **L sion arrondie de taille moyenne 2,2x3,1 cm situ e en regard de la jonction il o-colique, de paroi fine, avec un contenu liquidien d'aspect cellulaire, avec des  l ments  chog nes mobiles en suspension. La ponction r v le un liquide d'aspect laiteux et fibrineux. Cet aspect de type kyste chyleux est compatible avec un lymphangiome kystique du m sent re (affection rare).**

Le traitement sera   adapter en fonction de la nature de la l sion (th rapeutique +/- chirurgical)

Une antibioth rapie large spectre peut  tre envisag e en attendant les r sultats.

Confraternellement,

Dr Camille Odin


Dr Odin Camille
V t rinaire (n  24738)
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adress e   camilleodin@gmail.com

Site : www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.H l ne LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
M decine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com