



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 29/11/19
Dr.Vétérinaire : AIT MAMAR

Propriétaire : RICHARD
Animal : "MELO" européen MC né le 31/10/18

ANAMNESE

- Pollakiurie, hématurie depuis 3 semaines**
- Amélioration partielle sous kesium et spasmoglucinol**

EXAMEN

- **Vessie :** Remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène avec important dépôt hyperéchogène en zone déclive, avec cône d'ombre franc. Dépôt hypoéchogène surnageant associé, et nombreuses particules échogènes en suspension. Col vésical libre.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. Kyste anéchogène bilobé de paroi fine 6,3 mm, avec renforcement postérieur, en zone corticale craniale ante hilare à droite. Parenchyme périphérique non modifié. RG 3,9 cm, RD 4,01 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 3,9 mm, SD : 3,8 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Taille, forme, échogénicité normale. Vascularisation sans anomalie.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale 1,9 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Bol alimentaire en transit (non à jeun). Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles sèches en quantité assez importante.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**
- **Appareil** RAS

reproducteur :

- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Sablose vésicale importante, avec sédiment inflammatoire.**
- ❖ **Cosprostase modérée.**
- ❖ **Kyste rénal cortical isolé bénin de 6 mm de découverte fortuite.**

Prise en charge conseillée :

Aliment type Urinary croquettes, voire humide si non suffisant

Antispasmodiques, AINS lors des crises

Fontaines à eau

Eviter le surpoids

Favoriser l'exercice à la maison

Risque d'obstruction urétrale

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

