



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 02/12/19

Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

**Propriétaire :** BIDEAU

**Animal :** "ALMA" cocker 14 ans FS

## ANAMNESE

- Urée 1,1 g/l, Creat 25,3 mg/L**
- Reprise de poids suite passage aliment k/d**
- Bilan renal**
- 

## EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille diminuée surtout à gauche. Contours bosselés. Echogénicité augmentée de façon diffuse et échostructure normales. Atténuation de la différenciation corticomédullaire. Absence de lithiase pyélique. Dilatation pyélique gauche 4 mm RG 4,15 cm, RD 5,48 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 6,6 mm, SD : 6 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Taille, forme, echogénicté normale. Vascularisation sans anomalie.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille augmentée. Echogénicité augmentée de façon généralisée et modérée. Contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Discrètement bosselé à gauche. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** castrée

- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/  
biopsies :** Cystocentèse échoguidée : 3 mL urines claires

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Néphropathie bilatérale chronique plus avancée à gauche avec atrophie rénale, associée à une protéinurie significative (2++ bandelettes, DU 1012), sans infection urinaire ce jour.**
- ❖ **Maladie de surcharge bénigne hépatique.**

### Prise en charge conseillée :

Aliment K/D à vie

Eviter les écarts alimentaires gras (cf. antécédents de pancréatite aigue)

Rajout d'un IECA au choix

En cas de rechute d'incontinence, éviter le Propalin Nd.

Dépister régulièrement une éventuelle infection urinaire pour prise en charge au besoin.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

