



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 11/12/19
Dr.Vétérinaire : RAUX

Propriétaire : BOUTELOUP
Animal : OBAMA, jack M né le 21/04/18

ANAMNESE

- ☐ **Pics d'hyperthermie/abattement d'origine indéterminée. Début aout 2019.**
- ☐ **Séjour dans le sud en juillet, PCR maladies vectorielles négatives, sérologies positives ehrlichia et anaplasma avec titrage dégressif sur 1 mois**
- ☐ **Amélioration sous tétracyclines**
- ☐ **Rechute à l'arrêt du traitement, sérologie de nouveau réalisé : négative,**
- ☐ **CRP très augmentée.**
- ☐ **Recherche d'une cause abdominale**
- ☐ **Pic de fièvre 40° la veille**

EXAMEN

- **Vessie :** En semi repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 4,56 cm, RD 4,7 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
SG : mm, SD : mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Taille, forme, échogénicité normale. Vascularisation sans anomalie.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Discrète hypoéchogénicité diffuse homogène. Contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale 3,1 mm, avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** RAS

- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytaponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION


- ❖ **Absence d'anomalie abdominale expliquant l'hyperthermie.**
- ❖ **Discrète hypoéchogénicité diffuse hépatique non spécifique, possiblement réactionnelle en relation avec l'hyperthermie.**

Prise en charge conseillée :

Recherches complémentaires d'une cause dysimmunitaire: polyarthrite (ponction articulaires), méningite. Une ponction de LCS voie haute sous AG est réalisée ce jour par mes soins en vue d'analyse (cytologie, cellularité, protéinorrachie).

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551