

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date: 28/12/17 **Propriétaire:** Mme Lecat

Vétérinaire traitant: Dr. Barré Animal: Anais, Bouledogue FR, FS,

née le 23/09/2005, 8,2 kg

ANAMNESE

BEG malgré une augmentation des enzymes hépatiques

Dec 2017 : Lésions modérées de gastrite chronique. A relier à la race. Boue biliaire en faible quantité non spécifique.

 ALT 487 (220 en 2017) PAL 722 (205 en 2017) GGT 25 urée 0,66 g/L creat 16 mg/L SDMA 26

EXAMEN

Vessie: Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de

sédiment ou de lithiase vésicale.

Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation Reins:

corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de

lithiase pyélique. RG: 4,3 cm RD: 4,6 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.

Urètre : Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales: Taille, forme et échostructure normales. SG: 7,2 mm SD: 7,4 mm

Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours Rate:

normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.

Parenchyme hétérogène de taille légèrement diminuée, modérément Foie:

hypoéchogène. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies

biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu échogène mobile en suspension

occupant un faible volume de la VB.

Estomac: Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale 3,9mm avec

> épaississement de la couche musculeuse hypoéchogène. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence

d'anomalie pylorique.

Pancréas: Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale environnante.

Duodénum: Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée. > **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

Colon : Paroi fine. Air et selles en quantité normale.

Nœuds

lymphatiques : Absence de lymphadénomégalie abdominale.

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur: Stérilisé.

Autre RAS

Cytoponctions/

biopsies:

Non réalisées.

CONCLUSION

- Lésions hépatiques parenchymateuses diffuses en faveur d'un processus chronique de type fibrotique. Le diagnostic de certitude repose sur la réalisation de biopsies hépatiques.
- Lésions discrètes de gastrite chronique persistantes. A relier à la race.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille` Vétérinaire (n° 24738) camilléodin@gmaik.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site: www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie

mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN

Echographie abdominale Echographie cardiaque

camilleodin@gmail.com