



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 05/02/20
Dr.Vétérinaire : NENARD

Propriétaire : SAUVAGE
Animal : "FLANELLE" CN shi tzu FS née le 28/06/10

ANAMNESE

- Hyperthermie 40,3**
- Anorexie**
- Douleur abdominale**
- Hyperurémie, amylase/lipase augmentées**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Présence de particules échogènes en suspension et en forme de dépôt déclive en quantité modérée. Absence de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Différenciation corticomédullaire légèrement atténuée. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 5,4 cm, RD 5,6 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 7,7 mm, SD : NO. (épaisseur maximale)
- **Rate :** Taille, forme, échogénicité normale. Vascularisation sans anomalie.
- **Foie :** Parenchyme hétérogène avec présence de nodules hyperéchogènes, certains isoéchogènes à centre hyperéchogène (5-15 mm). Hépatomégalie. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec particules échogènes mobiles.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi épaissie de façon diffuse modérée. Architecture en couches conservée. Pylore perméable normal.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. L'hyperéchogénicité de la graisse abdominale est diffuse et n'apparaît pas centrée sur le pancréas.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Épaisseur normale à légèrement augmentée.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Épaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Vide replié sur lui-même.
- **Nœuds lymphatiques :** Gastrique visible 4-5 mm.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Epanchement discret. Hyperéchogénicité diffuse nette de la graisse abdominale, plus marquée en région crâniale.
- **Appareil** RAS

reproducteur :

- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/
biopsies :** Non souhaitées.

CONCLUSION

- ❖ **Péritonite abdominale d'intensité importante, associée à la présence de nodules hépatiques multiples.**
- ❖ **Gastrite non spécifique.**
- ❖ **Colite réactionnelle.**

Un processus tumoral hépatique agressif est fortement suspecté.
Les ponctions hépatiques ne sont pas souhaitées par la propriétaire.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

