



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 20/09/21
Dr.Vétérinaire : TURBE

Propriétaire : DEMOYER
Animal : "PRINCESSE ZELDA", Chow
Chow FS née le 22/11/2019

ANAMNESE

- **Cystite et hématurie pollakiurie récidivante améliorée ponctuellement sous AI et AB.**

EXAMEN

- **Vessie :** Quasi vide. Paroi sévèrement épaissie (5-12 mm), boursouflée, de façon plus marquée au pôle cranio-ventral avec petites formations polypoïdes. Contenu anéchogène avec nombreuses particules échogènes en suspension, et nombreuses images millimétriques (1-2 mm) hyperéchogènes avec fins cônes d'ombre en zone déclive et dans le col urétral.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 6,41 cm, RD 6,43 cm.
- **Uretères :** Léger épaississement de l'abouchement distal vésical de façon plus marquée à gauche.
- **Urètre :** Paroi épaissie avec contenu hyperéchogène non obstructif fin.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 4,7 mm, SD : 4,6 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation. Repliée crânialement
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'aliments (non à jeun). Assez distendu. Paroi normale sur les zones explorables avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Lobe gauche légèrement hyperéchogène de façon diffuse. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale. Bol alimentaire en transit.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale. Bole alimentaire en transit.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. IM 5,5 à 5,7 mm épaisseur.
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** RAS

- **Appareil reproducteur :** Col légèrement épaissi. Cornes fines. Ovaires normaux sans follicules.
- **Autre**
- **Cytaponctions/ biopsies :** Cystocentèse réalisée (3 mL d'urines jaunes).

CONCLUSION

- ❖ **Cystite très marquée avec petites lithiases millimétriques (conséquences de l'infection urinaire chronique).**
- ❖ **Urétrite et urétérite distale d'intensité modérée associée.**
- ❖ **Absence d'autre anomalie abdominale décelable.**
- ❖ **Ovaires en anoestrus.**


Prise en charge conseillée :

ECBU sur les urines prélevées ce jour pour adaptation de l'antibiothérapie (3 semaines minimum)
Soins locaux cutanés périvulvaires réguliers (tonte, ex. hibitane + surolan ND en cas d'inflammation marquée).

Aliment anti-calculs (struvites) éventuellement indiqué. Eau à volonté.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551