



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 10/09/21
Dr.Vétérinaire : DELNOOZ

Propriétaire : DUCHEMIN
Animal : "Yummy", X BOXER FS née le
10/05/2020, 22,6 Kgs

ANAMNESE

- Incontinence depuis plusieurs mois apparue environ 6 mois post stérilisation.**
- Analyse urines et PS rénale normales.**
- Examen réalisé après injection furosémide 20 mg SC**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. Jets urétéraux visibles normaux à droite et à gauche. Abouchements à la papille normaux.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales à gauche, légèrement bosselé et de taille diminuée à droite. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 5,8 cm, RD 4,99 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible. Abouchements urétéraux normaux à la vessie. Discrètement dilatés (cf. injection furosémide)
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 5,6 , SD : 6 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec dépôt échogène en zone déclive sur 20 % du volume.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.


- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil** Stérilisée. Col normal.
- reproducteur :**
- **Autre**
- **Cytoponctions/** Non réalisées.
- biopsies :**

CONCLUSION

- ❖ **Examen urétéral normal. Absence notamment d'uretère ectopique.**
- ❖ **Discrète atrophie rénale droite sans modification corticomédullaire, d'origine congénitale possible. Une échographie de suivi dans 1 an peut éventuellement être réalisée si souhaité.**
- ❖ **Reste de l'examen abdominal normal.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551