



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 27/09/21
Dr.Vétérinaire : NENARD

Propriétaire : LEFEBVRE
Animal : "CALISSON", européen MC né le 01/05/12

ANAMNESE

- **Augmentation progressive de la créat depuis 5 mois (17, puis 18 puis 20 mg/L)**

EXAMEN

- **Vessie :** Peu remplie. Paroi régulière Régulière. Contenu anéchogène avec images piqueté échogènes en suspension en petite quantité. Absence de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille et forme normales. Cortex légèrement épaissi. Atténuation modérée de la jonction corticomédullaire. Fines images millimétriques en faible nombre (2-3) dans les voies urinaires à gauche, avec très fin cône d'ombre. Absence de dilatation pyélique. RG 4,3 cm, RD 4,68 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 3,7, SD : 3,2 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. 2 nodules hyperéchogènes (4,6 mm et 8,5 mm plus caudal) dont le plus caudal avec ombre postérieure dans la queue de la rate. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Très discret épanchement échogène.

- **Appareil reproducteur :** Ras
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Cystocentèse échoguidée


CONCLUSION

- ❖ **Néphropathie bilatérale chronique non spécifique (néphrite, glomérulonéphrite chronique) de stade peu avancé.**
- ❖ **Présence de 3 lithiases millimétriques rénales gauches non obstructives, et de 5-6 lithiases de même taille libres dans la vessie.**
- ❖ **Cystocentèse échoguidée réalisée ce jour pour analyse.**
- ❖ **2 nodules spléniques d'aspect bénin**

Aliment rénal au long cours conseillé, si possible humide pour limiter la formation des calculs.
Si présence d'une protéinurie significative (RPCU>0,5) : IECA à mettre en place au long cours.
Chélateur de phosphore si hyperphosphorémie à la PS (Ipakitine ND ou easypill renal ND par ex.)
Eviter les médicaments ayant une influence négative sur la fonction rénale.
Eau, fontaines à volonté.
Dépister une hypertension artérielle sous-jacente et la traiter si présente.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551