



11 rue de Verdun  
14780 LION-SUR-MER  
www.veterinaires-consultants.fr

# ECHOCARDIOGRAPHIE DOPPLER

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire consultante.

Activité itinérante MANCHE – CALVADOS – ORNE – LE HAVRE

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme Inter-Universitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 13/09/21

Dr.Vétérinaire : NENARD

Propriétaire : MABIRE

Animal : « MINETTE », 15A, européenne  
FS

## ANAMNESE

- Nodules mammaires
- Amaigrissement et vomissements

Examen écourté par la non coopération de Minette : voies d'abord droit uniquement.

## MESURES

Paramètres	Valeurs (mm)	Paramètres	Valeurs (mm)
VDd	6,1	Feuillet antérieur mitral	Normal
SIVd	5	AD/AG	Normal
VGd	15,9	Ao/Tp	Normal
PPVGd	2,9	E-SIV	Normal
SIVs	4,6	Doppler pulmonaire Vmax=	0,9 m/s
VGs	11,6	Doppler aortique Vmax=	NO
PPVGs	4,1	SIV ss Ao mode 2D	mm
FR	27%	E/A mitral	
AG/Ao	10,4/10,6= 0,98		
		FC	200 bpm

## DESCRIPTION

- ✚ Les **coupes Temps-Mouvement transventriculaire et transmitrale** obtenues par voie parasternale droite montrent :
  - Un ventricule gauche de morphologie et de cinétique normales
  - Un inotropisme ventriculaire gauche normal
  - Un ventricule droit normal.
- ✚ L'examen de **l'atrium gauche et de la valve mitrale** révèle :
  - Un atrium gauche de taille normale;
  - Des feuillets mitraux normaux
  - Des cordages associés normaux;
- ✚ La **coupe 2D transaortique** obtenue par voie parasternale droite permettant de dérouler le **tronc pulmonaire** permet de mettre en évidence :
  - Un tronc pulmonaire de taille normale.
  - Une valve pulmonaire d'aspect normal.
  - Un flux pulmonaire laminaire, de vitesse normale.
  - Une valve aortique composée de trois cuspidés, d'aspect normal.
  - L'absence de persistance du canal artériel
- ✚ La **coupe 2D 4 et 5 cavités** obtenue par voie parasternale droite met en évidence :
  - Un atrium droit normal.
  - Une absence de communication interatriale ou interventriculaire.
  - Des feuillets tricuspidiens normaux
  - L'absence de CIA ou de CIV

Absence d'épanchement péricardique ou pleural.


## **CONCLUSION**

---

**Examen échographique cardiaque normal (examen limité par la non coopération de Minette)**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



**Marie-Hélène LASSERON**  
11 rue de Verdun  
14780 LION-SUR-MER  
N°18551

*Images disponibles sur demande e-mail adressée à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)*