



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 13/09/21  
Dr.Vétérinaire : NENARD

**Propriétaire :** MABIRE  
**Animal :** "MINETTE"? EUROP2ENNE &(a

## ANAMNESE

---

- Vomissements**
- PA normale.**

## EXAMEN

---

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation pyélique. 2 images de 4,9 et 1 mm dans les récessus pelviens à droite. RG 3,54 cm, RD 3,63 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille augmentée. Contours irréguliers du bord cranio médial gauche, et taille augmentée. Dépôt hyperéchogènes à la jonction corticomédullaire, de façon bilatérale et régulière, avec un dépôt générant un fin cône d'ombre pour la surrénale droite. SG :6 , SD : 7 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. Nodule hyperéchogène 4,4 mm bien délimité en zone dorsale du lobe médial droit.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi épaissie 2,8 mm, plis épaissis. Architecture en couches en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie. CPP 2-2,3 mm.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. JJ mésentérique 3,1 mm d'épaisseur maximale.

- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** Lipome de 4,92 cm, ovalaire en zone moyenne ventrale, bien d limit . Hyper chog nicit  de la graisse abdominale en p riph rie de la masse spl nique.
- **Appareil reproducteur :** Castr , prostate 1,98 cm.
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non r alis es.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Gastrite non sp cifique.**
- ❖ **Adr nom galie bilat rale avec un aspect l g rement irr gulier   gauche et de min ralisations possiblement b nignes   droite : une hyperplasie b nigne bilat rale, ou un ad nome ou carcinome surr nalien notamment   gauche sont possible (probablement non s cr tant cf. absence d'hypertension).**

Envisager un ionogramme compl mentaire.

Envisager un changement alimentaire vers une aliment hyperdigestible stricte.

Traitement anti m tique et protecteurs gastriques.

Confraternellement,

Dr Marie-H l ne LASSERON



Marie-H l ne LASSERON  
11 rue de Verdun  
14780 LION-SUR-MER  
N 18551