mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54
www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 13/09/21
Dr.Vétérinaire : NENARD

Propriétaire : PIERRE DIT PREBOIS
Animal : "GALILEO", CKC MC né le 13/11/13. 9 Kgs

ANAMNESE

- ***Vomissements, constipation et diarrhée récurrents avec perte de poids depuis 1 an environ.***
- ***Vomissements suspects avec hématémèse***
- ***borborygmes***

EXAMEN

- **Vessie :** Vide. Paroi relativement régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 4,9 cm, RD 5 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 7,4 mm, SD :4,2 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec léger dépôt échogène mobile dans le col.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Présence de gaz limitant la réalisation des images. Paroi et plis épaissi de façon modérée. Architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur augmentée de façon diffuse, et au niveau de la musculeuse. Anses festonnées par endroits. Paroi 5,5 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales en quantité relativement importante.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. JJ 6 mm
- **Mésentère/** Lipome de 4,92 cm, ovalaire en zone moyenne ventrale, bien délimité.

Cavité abdominale : Hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie de la masse splénique.

- **Appareil reproducteur :** Castré, prostate 1,98 cm.

- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- **Entérite généralisée chronique d'intensité marquée.**
- **Absence d'autre anomalie abdominale décelable.**

Envisager :
Radiographie abdominale.
Traitement protecteur gastrique (sucralfate par exemple, ZITAC ND, …)
Antiémétiques.
Un aliment hyperdigestible STRICT et métronidazole 12,5-15 mg/kg M et S 8 jours.
En l'absence d'amélioration envisager

- une endoscopie
- une corticothérapie

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON