



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant, Itinérant en Normandie
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 29/09/2021
Vétérinaire traitant: Dr. Clause

Propriétaire : Mme Paillard
Animal : Channa, Shih tzu, FS, née le
12/10/2007, 7,6kg

ANAMNESE

- Diarrhée chronique avec dysorexie récente
- Pas d'amaigrissement rapporté
- Coprologie sans anomalie

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure modifiée, multiples kystes corticaux de petite taille (2 à 4 mm), échogénicité et taille normales. Atténuation de la différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation pyélique. Multiples lithiases pyéliques punctiformes. RG : 4,7 cm RD : 4,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 4,5 mm SD : 5,0 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale 4,4 mm. Architecture en couches conservée.

- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.
- **Colon :** Paroi modérément épaissie 2,3 mm. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/
Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisée.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/
biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Épaississement pariétal colique modéré en faveur d'une colopathie. Une colite chronique est notamment compatible avec cet aspect.**
- ❖ **Maladie rénale lithiasique chronique bilatérale. Une surveillance des paramètres rénaux peut être conseillée.**
- ❖ **Lésions spléniques diffuses en faveur d'un processus dégénératif bénin en première intention.**

Traitement conseillé :

- *Métronidazole : 15-20mg/kg 2x/j (enrofloxacin 5mg/kg /j si colite histiocytaire)*
- *Prednisone à doses AI ou immunosuppressive, parfois au long cours*
- *Topiques : smectite (efficace à doses importantes) en 2pq*
- *Alimentation hyperdigestible ou hypoallergénique*

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com



Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site : www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com